


照顾 你的猫



猫比狗慢了约六千年才成为养驯动物，不过在目前世界上成为宠物的猫和成为宠物的狗一样多。在很多国家，它们被视为圣物和受崇拜。猫虽然一般上比狗更能自立，但是仍需要爱护和关怀。

WSPA

World Society for the Protection of Animals

怎样照顾你的猫



猫的住处

- 住在屋外的猫，需要一个庇护处来防御炎热和寒冷气候。
- 它需要一张床，如一只旧箱和被单。



食物和水

- 猫需要各种有营养的食物，不能只吃残剩食物。猫的食料比狗需要更多的肉类，更多的蛋白质和脂肪。
- 现在有很多种均衡的猫的食料可以买得到，包括罐头食品及干粮。
- 猫必须时常饮用新鲜食水，尤其是当你以干粮喂养时。
- 成年的猫，一天喂养两次；小猫，老猫及怀孕的猫每天必须少食多餐。
- 猫不必在饿时才寻食，它们习惯成自然。



人类伙伴

- 猫比狗更容易照顾，例如你无需带猫散步。
- 轻声细语及抚摸猫，就能显示你在爱护它。



健康

- 到处乱走的猫，或养在脏处的猫，很容易感染虫害或虱子。
- 睡与住处，务必保持清洁。
- 健康猫的毛色光亮，眼睛干净。
- 耳鼻不应流出污物，应保持清洁及预防感染。
- 牙齿必须坚固，呈白色，不可变色。有病之齿龈如果没有加以治疗，牙齿会脱落而对吃造成问题。
- 向你的兽医求教。



预防注射

- 猫很容易染上各种危险疾病，且疗费昂贵。
- 预防注射可防病及减少感染其他猫之风险。



刷拭

- 对所有猫儿，不论长短毛，时常刷拭可觉察它身上是否有寄生物。

- 长毛的猫需要特别照顾，以免毛皮松乱。
- 刷拭可使猫儿习惯於抚弄。



繁殖

- 每年有成千上万只猫被毁掉，因为没有足够及适合之住所。
- 雌猫每年生出很多小猫。在六年内，一对猫及它们的后代，能生出420,000只猫。
- 经常生产及护养小猫，对雌猫健康有不良影响。
- 有孕及授乳的雌猫，需要额外食物。
- 一般上小猫吸母乳为期大约三周，然后逐渐吃另外食物。
- 雌猫有保护小猫之天性，因此应为它们提供安静之处。
- 为防止不需要之猫儿，应让兽医为你的猫动绝育手术。



絕育手术

- 现代的兽医设备及药物，使手术安全，无痛及很快复原。
- 请教你的兽医何时为你的猫动阉割手术。
- 雌猫不必在临产前才动手术。
- 猫儿到有八周大就动手术，现已被认为是一项积极做法。
- 施过手术之雌猫就不再有发春期，雄猫也不会再来找它。
- 动过手术之雌猫能减少患乳肿癌之风险。
- 无阉过之雄猫习於发出难闻之气味，显示所在之处以吸引雌猫。雄猫在动手术后可减少这行为。
- 絶育也可减少猫儿之间之敌对打架。
- 絶育后的猫，会比较忠诚和有慈爱心，而它们捕食能力不会受影响。
- 在仍受麻醉剂影响时，将游荡及野猫之左耳顶端割掉，是一种普遍的方法以识别曾动过手术之猫儿。



WSPA是一个国际性组织，在七十六个国家展开活动，有超过三百五十个成员协会。WSPA在联合国（UN）及欧洲议会（CoE）有其代表，并配合世界卫生组织（WHO）及欧洲友伴动物兽医联合会（FECAVA）共同工作。



WE BELIEVE
Consultative Status with the
Economic-Social Council

当地联络处



World Society for the Protection of Animals

89 Albert Embankment, London, SE1 7TP, UK.
Tel: +44 (0)20 7793 0540 Fax: +44 (0)20 7793 0208
e-mail: petrespect@wspa.org.uk www.wspa.org.uk